

11. Übungsblatt

(zum 10. bzw. 11.01.2012)

Aufgabe 38 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

- Vier Kugeln werden der Reihe nach auf vier Kästen verteilt, wobei alle 4^4 Reihenfolgen gleichwahrscheinlich sein mögen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kasten genau drei Kugeln enthält, wenn die ersten beiden Kugeln in verschiedene Kästen gelegt werden?
- Über eine bestimmte Familie sei bekannt, dass sie zwei Kinder hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind, wenn bekannt ist, dass mindestens ein Kind ein Mädchen ist?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in Teilaufgabe b), wenn bekannt ist, dass das jüngere Kind ein Mädchen ist?

Aufgabe 39 Stochastische Unabhängigkeit

- Ein Glücksrad habe 36 nummerierte Sektoren (Zahlen 1 bis 36). Die Sektoren seien folgendermaßen rot (R) oder blau (B) gefärbt:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R | R | R | R | R | B | B | B | B | R | R | R | R | B | B | B | B | B |
| 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |

Wir betrachten die drei Ereignisse

- A : das Glücksrad hält in einem roten Sektor,
- B : das Glücksrad hält in einem Sektor mit einer geraden Zahl,
- C : das Glücksrad hält in einem Sektor mit einer Zahl ≤ 18 .

Zeigen Sie, dass die Ereignisse paarweise, aber nicht vollständig¹ unabhängig sind!

- Zwei faire Würfel, ein roter und ein weißer, werden geworfen. Wir betrachten die drei Ereignisse

- A : der rote Würfel zeigt eine 1 oder eine 2,
- B : der weiße Würfel zeigt eine 3, 4 oder 5,
- C : die Summe der Augenzahlen ist 4, 11 oder 12.

Zeigen Sie, dass die Ereignisse vollständig, aber nicht paarweise unabhängig sind!

Aufgabe 40 Der Bayessche Satz

- Ein Wettersatellit sendet eine binär kodierte Beschreibung eines sich entwickelnden Sturmes. Durch unvermeidliches Rauschen, z.B. durch den Sturm verursachte atmosphärische

¹Als vollständig unabhängig sei hier nur der Fall $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ verstanden.

Störungen, wird jedoch ein gewisser Übertragungsfehler hervorgerufen. Angenommen, die Nachricht besteht zu 70% aus Nullen und die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesendetes Bit korrekt empfangen wird, betrage 80%: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Null gesendet wurde, wenn eine Eins empfangen wird?

- b) Etwa 5 von 100 Männern und etwa 25 von 10 000 Frauen sind farbenblind. Eine farbenblinde Person werde zufällig ausgewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person ein Mann ist?

Aufgabe 41 Der Bayessche Satz

- a) In einer gegebenen Population leiden 2 % aller Menschen an einer bestimmten Krankheit. Ein Test habe die Eigenschaft, dass er bei Kranken in 95 % und bei Gesunden in 99 % aller Fälle die richtige Diagnose stellt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person, bei der auf Grund des Tests die Krankheit (nicht) diagnostiziert wird, auch tatsächlich (nicht) an dieser Krankheit leidet?
- b) Gegeben seien zwei Urnen. Urne 1 enthalte zwei weiße und eine rote Kugel, Urne 2 eine weiße und zwei rote. Es werde zuerst zufällig eine Kugel aus Urne 1 gezogen und in Urne 2 gelegt. Anschließend wird zufällig eine Kugel aus der Urne 2 gezogen. Angenommen, die aus Urne 2 gezogene Kugel sei rot: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die aus Urne 1 in Urne 2 überführte Kugel weiß war?